

GAMME
instruments

Aniosyme DD1 ..... page 6
Aniosyme PLA II ..... page 6
Hexanios G+R ..... page 7
Microsept ..... page 7
Stéranios 2% ..... page 8
Stéranios 20% concentré ..... page 8
Aniosept Activ ..... page 9
Anioxyde 1000 ..... page 9
Anios DLH ..... page 10
Aniosyme DLM ..... page 10
Anios RL ..... page 11
Anios RN ..... page 11
Anios R444 ..... page 11
Instrubacs autoclavables ..... page 12
Instrubacs non autoclavables ..... page 12

Gamme instruments

les nettoyants pré-désinfectants

CE 0459

ANIOSYME DD1

» pH neutre

» Premier détergent liquide tri-enzymatique aux propriétés détergentes

INDICATIONS : Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique, nettoyage en bacs à ultrasons, ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Propionate d'ammonium quaternaire, chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), surfactants, agents stabilisants, agent séquestrant, parfum, colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170, SARM (EN 13727), Actif sur Mycobacterium tuberculosis (B.K.). Levuricide : EN 1275, EN 13624 (C. albicans). Actif sur HIV-1, BVDV (virus modèle HCV), PRV (virus modèle HBV) et Herpès virus.

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :

200 doses de 25 ml	**1200.097**
12 flacons de 1 litre doseur	**1200.095**
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml	**1200.036**

CE 0459

ANIOSYME PLA II

» Complexe tri-enzymatique (protéase, lipase, amylase)

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection tri-enzymatique des dispositifs médica l'instrumentation souillée, nettoyage manuel avant stérilisation, nettoyage en bacs à u en machine à laver l'instrumentation.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, tensio-actif non ioniq enzymatique (protéase, lipase, amylase), agent séquestrant, excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-170. Actif tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275, EN 13624. Actif sur HIV-1, Rotavirus, Herpès modèle HBV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 5 minutes. Rincer après utilisa

CONDITIONNEMENTS :

100 doses de 25 g	
4 seaux de 2 kg	

CE 0459

HEXANIOS G+R

» pH neutre
» Compatible avec les métaux inoxydables, verre et matières plastiques (polycarbonates, ...)

INDICATIONS : Nettoyage et pré-désinfection des instruments chirurgicaux et médicaux, des dispositifs médicaux, des instruments thermosensibles et du matériel d'endoscopie. Ramassage de l'instrumentation souillée.

COMPOSITION : Chlorure de didécyldiméthylammonium, polyhexaméthylène biguanide, complexes détergents (alcool gras polyalcoxylé, oxyde de lauryldiméthylamine), agent séquestrant et dispersant, parfum et colorant.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171, T 72-300 (A. baumanii), NF T 72-190, SARM (EN 13727). Actif sur Mycobacterium tuberculosis (BK). Fongicide : EN 1275 (C. albicans), EN 13624. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV).

MODE D'EMPLOI : Utilisation à 0,5%. Temps de contact : 15 minutes. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :

50 doses de 25 ml	**165.136**
200 doses de 25 ml	**165.097**
3 flacons de 1 litre doseur	**165.137**
12 flacons de 1 litre doseur	**165.095**
1 bidon de 5 litres + pompe 25 ml	**165.046**
4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml	**165.036**



CE 0459

MICROSEPT

INDICATIONS : Nettoyage et désinfection des fraises et instruments rotatifs (pour la podologie).

COMPOSITION : Alkylaminoalkylglycine, agent séquestrant, éthanol en milieu alcalin.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040 - NF T 72-171. Fongicide : EN 1275 (Candida albicans). Actif sur HIV-1, et HBV.

MODE D'EMPLOI : Solution prête à l'emploi pour usage professionnel. Temps de trempage optimum : 15 minutes. Rincer à l'eau potable après utilisation.

Photo non contractuelle.

CONDITIONNEMENT :

2 bidons de 2 litres	**223.064**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme instruments

les désinfectants de haut niveau

CE 0459

STÉRANIOS 2%

» Prêt à l'emploi

» Actif en 10 minutes (1 heure pour sporicidie)

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible.

COMPOSITION : Solution de glutaraldéhyde (2% de matière active) tamponnée à pH 6, en présence d'un catalyseur d'effet de surface.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 14561. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624, EN 14562. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV, Herpès virus et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230/231, T 72-301 (C. difficile).

MODE D'EMPLOI : Produit prêt à l'emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 1 heure pour la sporicidie.

CONDITIONNEMENTS :

1 bidon de 2 litres	**382.062**
1 bidon de 5 litres	**382.047**
4 bidons de 5 litres	**382.034**
Bandelettes de contrôle du taux de glutaraldhéhyde (boîte de 60)	**100.991**

CE 0459

STÉRANIOS 20% CONCENTRÉ

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau des dispositifs médicaux, matériel chirurgical et médical, matériel d'endoscopie et matériel thermosensible, en bain statique ou en machine automatique.

COMPOSITION : Solution concentrée de glutaraldéhyde (20%) stabilisée par un complexe hydroalcoolique, colorant et excipients.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, NF T 72-171. Mycobactéricide : BK, EN 14348, pr EN 14563. Fongicide : EN 1275, EN 13624. Virucide : NF T 72-180. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230 (B. cereus, B. subtilis), NF T 72-231 (C. sporogenes), T 72-301 (B.cereus).

MODE D'EMPLOI : Utilisation en dilution à 5 ou 10% selon le temps de contact et la concentration finale de glutaraldéhyde souhaités.
Dilution 5% : soit 250 ml pour 5 L, 500 ml pour 10 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 1%.
Dilution 10% : soit 250 ml pour 2,5 L, 500 ml pour 5 L. Concentration finale de glutaraldéhyde : 2%.

CONDITIONNEMENT :

20 flacons de 500 ml	**182.145**

ANIOSEPT ACTIV

» Poudre 2 en 1 : Nettoyage et désinfection + désinfection de haut niveau
» Large spectre anti-microbien en 15 minutes
» Contrôle de la dilution par bandelette spécifique

INDICATIONS : Nettoyage désinfection et désinfection de haut niveau / stérilisation à froid des instruments et endoscopes, matériel thermosensible.

COMPOSITION : Poudre à base de percarbonate de sodium, tétraacétyléthylènediamine et chlorure de N-alkyl(C12-14)-N-benzyl-N, N-diméthylammonium. Production extemporanée d'acide peracétique en dilution dans l'eau.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Nettoyage désinfection en 15 minutes à 1% : bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561), fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562), tuberculocide (EN 14348). **Désinfection de haut niveau en 15 minutes à ≥2% :** bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 14561). Fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 14562), mycobactéricide (EN 14348). Virucide (EN 14476), actif sur PRV (virus modèle HBV) et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide (EN 13704).

MODE D'EMPLOI : Utilisation en trempage : immerger l'instrumentation après dissolution complète de la poudre dans l'eau froide ou tiède (+30°C). Temps de contact : 15 minutes. Rincer soigneusement.

CONDITIONNEMENT :
2 seaux de 5 kg **1896.319**



ANIOXYDE 1000

» Alternative au Glutaraldéhyde
» Formulé sans acide acétique, pH neutre
» Sporicide en 30 minutes
» Contrôle par bandelettes
» Premier désinfectant de Haut Niveau issu du Système PHERA®
» Produit breveté

INDICATIONS : Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d'endoscopie, du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

COMPOSITION : Production extemporanée d'acide peracétique à partir de l'acétylcaprolactame (système PHERA®). ANIOXYDE 1000 générateur contient 3% de peroxyde d'hydrogène.

PROPRIÉTÉS MICROBIOLOGIQUES : Bactéricide : EN 1040, EN 13727, EN 1276, NF T 72-171, T 72-301, NF T 72-190, EN 14561. Mycobactericide : EN 14348, pr EN 14563, T 72-301. Fongicide : EN 1275, EN 1650, EN 13624, EN 14562, NF T 72-190. Virucide : EN 14476. Actif sur HIV-1, HBV et BVDV (virus modèle HCV). Sporicide : NF T 72-230, NF T 72-231, NF T 72-190.

MODE D'EMPLOI : La solution obtenue après activation est prête à l'emploi. Temps de contact : 10 minutes ou 30 minutes pour sporicide. Rincer après utilisation.

CONDITIONNEMENTS :
4 bidons de 5 litres + activateur intégré **1081.299**
Bandelettes de contrôle du taux d'acide peracétique (boîte de 50) **100.194**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme instruments

utilisation en machine



CE

ANIOS DLH

» Détergent alcalin
» Recommandé en combinaison avec ANIOS RN
» Utilisable dans toute qualité d'eau

INDICATIONS : Nettoyage du matériel chirurgical et médical et des dispositifs médicaux en machine à laver automatique.

COMPOSITION : Hydroxyde de sodium et dérivés carboxyliques à effets dispersant et séquestrant.

MODE D'EMPLOI : Utilisation aux dilutions comprises entre 0,3 et 0,5% en eau froide ou chaude. Température optimale d'utilisation : entre +55°C et +70°C.

CONDITIONNEMENTS :
2 bidons de 5 litres **164.038**
1 bidon de 10 litres **164.024**



CE

ANIOSYME DLM

» pH alcalin
» Haute compatibilité avec les matériaux
» Adapté pour le nettoyage des optiques de dispositifs médicaux
» Recommandé en présence de souillures organiques importantes

INDICATIONS : Nettoyage du matériel chirurgical, médical et des dispositifs médicaux en machine à laver automatique et tunnel de lavage. Compatible avec inox, titane, synthétique, polysulfones, PVC-ABS, aluminium anodisé...

COMPOSITION : Tensio-actif non ionique, glycol, agents séquestrants, agents stabilisants et complexe enzymatique (protéase, lipase, amylase).

MODE D'EMPLOI : Utilisation aux dilutions comprises entre 0,1 et 0,5%. Injection en eau tiède à chaude selon les types de machines. La température optimale d'activité enzymatique se situe entre +40°C et +70°C.

CONDITIONNEMENTS :
2 bidons de 5 litres **1569.038**
1 bidon de 10 litres **1569.024**



CE

ANIOS RL

» Lubrifiant avec activateur de séchage
» Haute compatibilité avec les polysulfones

INDICATIONS : Rinçant neutre avec effet lubrifiant pour les instruments chirurgicaux et médicaux. Pour un séchage rapide et sans trace.

COMPOSITION : Condensats d'oxyde d'éthylène et propylène. Dérivés glycoliques. Alcools gras à effet anti-mousse.

MODE D'EMPLOI : Utilisation aux dilutions de 0,08 à 0,3% en eau froide ou chaude (soit 0,8 à 3 ml par litre d'eau) selon le type de machine. ANIOS RL est recommandé lors d'un rinçage avec une eau de qualité osmosée ou déminéralisée.

CONDITIONNEMENTS :
2 bidons de 5 litres **315.038**
1 bidon de 10 litres **315.024**



CE

ANIOS RN

» Neutralisant des produits alcalins
» Adapté pour des cycles courts de lavage des cuves

INDICATIONS : Neutralisation des résidus alcalins provenant des agents détergents et de l'eau lors du cycle de lavage en machine automatique des instruments médico-chirurgicaux et dispositifs médicaux. ANIOS RN est traçable par conductimétrie.

COMPOSITION : Acide phosphorique en solution aqueuse.

MODE D'EMPLOI : S'utilise à la dilution de 0,1 à 0,5% (soit 1 à 5 ml par litre d'eau), lors du cycle de rinçage.

CONDITIONNEMENTS :
2 bidons de 5 litres **193.038**
1 bidon de 10 litres **193.024**

CE

ANIOS R444

» Élimine les piqûres de rouille et dépôts minéraux

INDICATIONS : Produit spécial de rénovation des instruments en inox et dispositifs médicaux. Élimine les traces protéiques, les dépôts d'oxyde de fer et autres tâches d'oxydation.

MODE D'EMPLOI : Dilution recommandée à 5%. Temps de contact : 1 à 2 heures avec contrôle visuel toutes les 30 minutes. Rincer puis sécher soigneusement.

CONDITIONNEMENT :
3 flacons de 1 litre **191.137**

Produits dangereux - respectez les précautions d'emploi.

Gamme instruments

les instrubacs

INSTRUBACS AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage avec panier et couvercle en polypropylène. Bacs autoclavables à 134°C - 18 minutes.



1L Microchirurgie

VOL. UTILE	TAILLE PANIER	RÉFÉRENCE
0,5L	L24,5 x l11 x H9 cm	1L.....404.010

2L et 5L avec ou sans fente

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	RÉFÉRENCES
1	2L	L23 x l117 x H9 cm	1L avec fente....404.038
2	2L	L23 x l117 x H9 cm	1L sans fente ...404.039
3	5L	L36,5 x l125,5 x H9 cm	5L.....404.002NM



4L simple ou double

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	RÉFÉRENCES
1	4L	L42 x l14 x H8,5 cm	4L.....404.157
2	4L	L42 x l14 x H8,5 cm	4 L.....404.158

INSTRUBACS NON AUTOCLAVABLES

Bacs de trempage pour le ramassage de l'instrumentation souillée. Vendus avec panier et couvercle.

20L avec ou sans robinet

VOL. UTILE	TAILLE PANIER	SANS ROBINET	AVEC ROBINET
10L	L48,5 x l27 x H17cm	404.006	404.023

40L et 60L avec ou sans robinet

	VOL. UTILE	TAILLES PANIERS	SANS ROBINET	AVEC ROBINET
1	20L	L51 x l34 x H22cm	406.012	404.412
2	40L	L51 x l34 x H30,5cm	406.013	404.413



Spécial fraises

RÉFÉRENCE
404.050